Deux nouveaux Clérides (Col.) du Musée Zoologique d'Amsterdam.

par

M. PIC.

Opilo luteonotatus Pic v. nov. **reductus.** *Sat angustatus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, rufus, capite postice, thorace, illo antice rufo marginato, abdomineque nigris, elytris luteis, ante medium anguste et oblique, post medium late et transverse piceo fasciatis, sutura inter fascias et postice reducte brunnea, his antice pro parte fortiter lineatopunctatis, postice irregulariter punctatis ; membris testaceis, femoribus apice late piceis.* Long. 10 mill.

Chine : Tienmuschan (Suenson leg. ; Reitter vend.).

Diffère du type *O. luteonotatus* Pic par la forme plus étroite, les élytres moins régulièrement ponctués et à dessins foncés moins étendus antérieurement.

Pallenis soror Schenkl. v. nov. **reductefasciata.** *Parum elongata, nigra, griseo pubescens et longe hirsuta, elytris ad basin dentato pilosis, his sat brevibus, fere usque ad apicem lineatopunctatis, antice intus albo maculatis et extus albo reducte fasciatis, infra medium reducte arcuate albo fasciatis ; thorace sat elongato, postice valde angustato, antice transverse impresso, diverse, pro parte fortiter et dense punctato aut reducte plicato ; oculis valde incisis, non prominulis.* Long. 8 mill.

Madagascar : Mandritsara (don. Valck Lucassen).

Diffère de *P. soror* Schenkl. (ex description) par les dessins antérieurs blancs des élytres composés d'une macule et d'une fascie, au lieu de deux macules blanches et ces organes non densément pubescents de gris au sommet.